

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 120 F. Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON



☎ 80.22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 24 - 24 septembre 1986

Répondeurs :



80.24.64.21 (Beaune)
86.46.51.51 (Auxerre)
84.76.61.61 (Vesoul)

COLZA

Altises : *Très peu de captures*

*Surveiller les parcelles au stade :
cotylédons-1ère feuille*

COLZA

- Dans l'ensemble de la circonscription les levées sont régulières, et l'évolution soutenue de la végétation se maintient.
Uniquement dans quelques situations particulières, la végétation est freinée suite à des pluies violentes sur des terres limoneuses à tendance battante.
- Les stades végétatifs des parcelles sont variables selon les secteurs et (ou) les dates de semis :
les parcelles les plus en avance sont à 4-6 feuilles, les parcelles les plus en retard sont au stade cotylédons-1ère feuille étalée, et tous les intermédiaires existent.

ALTISES

SITUATION :

- Pas de début de vol nettement marqué, même après la remontée des températures depuis les 18-19/09. Les captures sont faibles et réparties irrégulièrement selon les postes de piégeage.

PRECONISATIONS :

- Parcelles n'ayant pas encore atteint le stade 2 feuilles vraies : surveiller et intervenir si un pied sur deux ou trois présente des morsures.
- Parcelles ayant dépassé le stade 2 feuilles vraies : ne pas envisager de traitement dans l'immédiat.

LIMACES

- A surveiller pour les parcelles au stade cotylédons-1ère feuille.
- Spécialités utilisables : Mesurool anti-limace 3 kg/ha
Granulés à base *métaldéhyde* 15-30 kg/ha

MOUCHE DU CHOU

RAPPEL DES PRECONISATIONS : Bulletin n° 21 du 17 juillet 1986

La réalisation de traitements en pulvérisation au stade B1 du colza avec Birlane, n'est pas une technique fiable actuellement.

P.1.5/6

CULTURES LEGUMIERES

— MOUCHE DE L'OIGNON

Si aucun traitement de sol n'a été effectué sur les semis d'oignon de jours courts, envisager un traitement de rattrapage en végétation.

CEREALES

— VERS BLANCS (département du Doubs)

- Les secteurs concernés : les communes Etalans, Hopital du Grosbois, Charbonnières-les-Sapins, ainsi que les zones limitrophes.
- Prévoir une protection insecticide, au moment des semis de céréales d'hiver, avec du *lindane* à 1 500 g de matière active par hectare.

*

*

*